

160 mm

# Melagyn®

## Floraprotect



**GLYCEROL, ÁCIDO LÁCTICO, α-GLUCOOLIGOSACARIDOS (α-GOS)**

 **LEA ESTAS INSTRUCCIONES DE USO DETENIDAMENTE ANTES DE USAR MELAGYN® FLORAPROTECT.**

### ¿Qué es la vaginosis bacteriana?

Una flora vaginal sana se caracteriza por una mayoría de lactobacilos (microflora buena) y un pH ácido. Estos lactobacilos producen esencialmente ácido láctico que ayuda a controlar el crecimiento de patógenos, manteniendo o recuperando un ecosistema vaginal saludable. Muchos factores pueden perturbar este ecosistema, como la menstruación, el embarazo, la actividad sexual o el uso de antibióticos. Por lo tanto, puede darse un crecimiento excesivo de algunos patógenos (normalmente presentes en la vagina, pero en baja cantidad) que puede provocar infecciones vaginales como la vaginosis bacteriana. Los síntomas principales de la vaginosis bacteriana son un olor vaginal "a pescado", secreciones anormales y malestar vaginal.

### ¿Qué es Melagyn® Floraprotect?

Melagyn® Floraprotect es una combinación única de glicerol, ácido láctico y los innovadores α-Glucooligosacáridos (α-GOS). Los α-GOS son sustratos específicos que contribuyen al crecimiento selectivo de lactobacilos en detrimento de los agentes patógenos. El ácido láctico respalda esta función disminuyendo el pH vaginal de forma natural.

Melagyn® Floraprotect alivia el malestar vaginal y los olores restaurando el pH normal y la flora vaginal. Además, Melagyn® Floraprotect proporciona una hidratación adicional y un efecto regenerador, protegiendo por tanto el epitelio vaginal de la deshidratación gracias a la alta capacidad de retención de agua del glicerol.

### ¿Cuándo usar Melagyn® Floraprotect?


Melagyn® Floraprotect está indicado para una rápida recuperación de un ecosistema vaginal normal, principalmente después del uso de antibióticos para tratar infecciones vaginales como la vaginosis bacteriana. Melagyn® Floraprotect alivia el malestar vaginal y los olores al restaurar el pH y la flora vaginal normales. Melagyn® Floraprotect también ayuda a prevenir las recidivas de la vaginosis bacteriana.

### ¿Cómo usar Melagyn® Floraprotect?

- Después de un episodio "aislado" de vaginosis bacteriana, aplicar 1 dosis (tubo) al día durante 8 días consecutivos, empezando el día después de la finalización del tratamiento con antibiótico. El tratamiento se deberá repetir tras la menstruación siguiente.
- En caso de recidivas frecuentes se seguirá el protocolo arriba indicado. A continuación, se deberá repetir el tratamiento de 8 días cada 6 meses, empezando el día después de finalizar la menstruación.

El gel vaginal Melagyn® Floraprotect se inserta directamente en la vagina. Se recomienda lavar las manos antes y después de aplicar el producto. En la Figura 1 se muestra una descripción detallada de cómo aplicar el producto.

Figura 1. Instrucciones de uso del tubo monodosis.



- Sujetar con firmeza el aplicador por el extremo grueso. Agitar arriba y abajo 4 veces para asegurar que el contenido se encuentra en el extremo estrecho.
- Doblar el extremo puntiagudo del aplicador adelante y atrás repetidamente. Romper la punta del tubo retorciéndolo. **No usar tijeras o herramientas para cortar el extremo del aplicador.**
- Sentarse o tumbarse sobre la espalda con las rodillas dobladas y coger el tubo con la mano e insertar con delicadeza el extremo delgado del aplicador en la vagina.
- Apretar con suavidad y firmeza el extremo grueso del aplicador 2-3 veces para depositar el gel en la vagina.
- Quitar el aplicador sin dejar de apretar y desecharlo en la basura.

### Ingredientes

Aqua, Glycerol, Lactic Acid, Alpha-Glucan Oligosaccharides, Polyacrylamide, C13-14 Isoparaffin, Sodium Benzoate, Laureth-7, Potassium Sorbate.  
SIN HORMONAS, ANTIBIÓTICOS, PERFUME Y PARABENOS.

300 mm



ilab Laura Nebot Sicart  
laura@ilab.cat  
artworks www.ilab.cat

Melagyn® Floraprotect  
monodosis de 5 ml de gel vaginal  
Código: G2861-01  
Prospecto 160x300 mm  
Tipografía ITC Franklin Gothic 8 pt  
Fecha 11/01/2021

### Colores

- Pantone Cool Gray 9 C
- Pantone 2587 C
- Pantone Process Magenta C
- Troquel

160 mm

# Melagyn®

## Floraprotect



### Advertencias y precauciones de uso

Asegurar condiciones higiénicas (p.e. limpiar las manos). No usar el gel vaginal **Melagyn® Floraprotect** si la monodosis no está intacta. El gel vaginal **Melagyn® Floraprotect** es para uso único de cada monodosis y no se debe reutilizar. El gel vaginal **Melagyn® Floraprotect** no debe usarse durante la menstruación. Se debe evitar la aplicación cuando se busca un embarazo dado que el pH bajo del gel crea un entorno menos favorable para el espermio. Además, el glicerol que contiene **Melagyn® Floraprotect** podría afectar a la movilidad del espermio. En caso de virginidad solo se deberá empezar el tratamiento con **Melagyn® Floraprotect** tras consultar a su médico. No usar el producto después de la fecha de caducidad indicada en el estuche y en cada monodosis cerca del símbolo. El número de lote se indica en el tubo cerca del símbolo.

### Interacciones con otros productos médicos y otras formas de interacción

No usar condones, membranas de látex (diafragmas), agentes espermicidas y otros tipos de métodos contraceptivos de barrera durante el uso del gel vaginal **Melagyn® Floraprotect** debido al riesgo de rupturas o falta de eficacia.

### Embarazo y lactancia

Debido a su composición y al método de acción del gel vaginal **Melagyn® Floraprotect**, el producto no se absorbe y por lo tanto no hay riesgo para el niño. Sin embargo, se recomienda consultar siempre a su médico antes de tomar cualquier tratamiento.

### Contraindicaciones

El gel vaginal **Melagyn® Floraprotect** no se debe usar en niñas jóvenes que no han alcanzado la pubertad o por mujeres con alergia conocida a cualquiera de los ingredientes.

### Efectos secundarios

Los efectos secundarios pueden incluir reacciones cutáneas como eritema, hinchazón, sensación de ardor o picazón en el área de aplicación. La sensación de ardor puede deberse al bajo valor de pH (pH 4.5) del gel vaginal **Melagyn® Floraprotect** que lleva a una mayor sensibilidad de la vagina. Puede ser de intensidad leve o moderada y suele ocurrir después de haber iniciado la aplicación. Debería desaparecer cuando se restablezca la flora vaginal. Muy raramente, pueden ocurrir también reacciones locales leves adicionales en respuesta a ciertos ingredientes del gel (p.e. sodium benzoate). Se debe consultar al médico de cabecera si se ve afectado el bienestar, si los síntomas empeoran o si no mejoran en 7 días.

### Precauciones especiales de almacenamiento

No conservar por encima de los 25°C. Conservar en un lugar seco protegido de la humedad. Mantener fuera del alcance de los niños.

### Tamaño del envase

El gel vaginal **Melagyn® Floraprotect** está disponible en cajas de 8 tubos aplicadores especialmente diseñados para un solo uso. Cada tubo contiene una única aplicación de 5 ml. El tubo se tiene que descartar tras su uso.

CE 0482

Fecha de la información: julio 2019

**Melagyn® Floraprotect** está clasificado y registrado como producto sanitario de acuerdo a la Directiva 93/42/CEE relativa a productos sanitarios.

Fabricante

**Hälsa Pharma GmbH**  
Maria-Goeppert-Str.5  
D-23562 Lübeck  
Alemania

Distribuidor

**Kern Pharma, S.L.**  
Venus, 72 – Pol. Ind. Colón II  
08228 Terrassa (Barcelona) - España  
www.kernpharma.com  
Teléfono de atención al cliente: 902.502.500

Gynea

G2861-01

300 mm



**ilab** Laura Nebot Sicart  
laura@ilab.cat  
artworks www.ilab.cat

Melagyn® Floraprotect  
monodosis de 5 ml de gel vaginal  
Código: G2861-01  
Prospecto 160x300 mm  
Tipografía ITC Franklin Gothic 8 pt  
Fecha 11/01/2021

### Colores

■ Pantone Cool Gray 9 C  
■ Pantone 2587 C  
■ Pantone Process Magenta C  
■ Troquel